

सहा महिन्यांचे हाडाचे इंजेक्शन

Denosumab (Prolia) – ऑस्टिओपोरोसिससाठी

मागील मात्रा कधी दिली:

पुढील मात्रा कधी घ्यायची:

या इंजेक्शनबद्दलची सर्वात महत्वाची गोष्ट

पुढील मात्रेला उशीर होता कामा नये किंवा ती चुकता कामा नये.

हे औषध शरीरात असेपर्यंतच काम करते. मात्रा चुकल्यास संरक्षण झपाट्याने उलटते आणि हाड **सुरु करण्यापूर्वीपेक्षाही जास्त कमजोर** होऊ शकते – ज्यामुळे मणक्याची हाडे अचानक मोडण्याचा खरा धोका असतो. हे मनाप्रमाणे बंद करून पुन्हा सुरु करण्याचे औषध नाही.

तुम्हाला ते बंद करायचे असल्यास, खर्चामुळे असो वा इतर कारणाने, आधी आम्हाला सांगा. संरक्षण टिकवण्यासाठी आम्ही दुसरे हाडांचे औषध सुरु करू. कधीही न सांगता बंद करू नका.

पुढील तारीख आजच तुमच्या मोबाईलच्या कॅलेंडरमध्ये लिहा, आणि दोन आठवडे आधीचा रिमाइंडर लावा.

काय अपेक्षित आहे

- दर सहा महिन्यांनी** त्वचेखाली एक इंजेक्शन. ते पटकन होते आणि क्लिनिकमध्येच दिले जाते.
- प्रत्येक मात्रेपूर्वी तुमचे **कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी नीट असणे आवश्यक** आहे आणि ती रोज चालू राहायला हवीत. आम्ही आधी रक्ताची तपासणी करू शकतो.
- काही दिवस पाठ, स्नायू किंवा हातापायांत सौम्य दुखणे सामान्य आहे.

दाताचे उपचार करण्यापूर्वी

तुमच्या दंतवैद्यांना सांगा की तुम्ही हे इंजेक्शन घेत आहात. दात काढायचा असल्यास आधी आम्हाला सांगा म्हणजे आम्ही योग्य वेळ ठरवू.

संपर्क करा, जर

तोंडाभोवती किंवा बोटांत मुंग्या, किंवा स्नायूंत गोळे व आखडणे – ही कॅल्शियम कमी असल्याची लक्षणे असू शकतात · मांडीत किंवा जांघेत नवीन दुखणे · जबड्यात दुखणे किंवा दात काढलेली जागा न भरणे · त्वचेचा कोणताही संसर्ग

